

Tenosinovitis y virus Chikungunya

El artículo sobre la tenosinovitis debida al virus Chikungunya, recientemente publicado en MEDICINA resulta de mucho interés¹. Seijo y col. informan en él sobre el hallazgo de tenosinovitis en un paciente con infección por el virus Chikungunya¹. Una cuestión relevante es no descartar que se trate de una co-ocurrencia. De hecho, la tenosinovitis puede ser un hallazgo en los pacientes con infección por el virus Chikungunya. Sin embargo, existe en esos casos un trastorno vascular concomitante². También pueden observarse otras manifestaciones sistémicas, como hepatomegalia³. Además, la tenosinovitis se presenta generalmente en sitios múltiples⁴. Es raro y poco frecuente que el paciente haga su consulta en primer lugar por una tenosinovitis de localización única.

Somsri Wiwanitkit¹, Viroj Wiwanitkit²

¹Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok Thailand,

²Hainan Medical University, China

e-mail: somsriviwan@hotmail.com

1. Seijo A, Luppó V, Morales A, et al. Tenosinovitis por virus Chikungunya. *Medicina (B Aires)* 2014; 74: 476-8.
2. Parola P, Simon F, Oliver M. Tenosynovitis and vascular disorders associated with Chikungunya virus-related rheumatism. *Clin Infect Dis* 2007; 45: 801-2.
3. Manimunda SP, Vijayachari P, Uppoor R, et al. Clinical progression of Chikungunya fever during acute and chronic arthritic stages and the changes in joint morphology as revealed by imaging. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 2010; 104: 392-9.
4. Simon F, Parola P, Grandadam M, et al. Chikungunya infection: an emerging rheumatism among travelers returned from Indian Ocean islands. Report of 47 cases. *Medicine (Baltimore)* 2007; 86: 123-37.