

Fuga de orina descubierta mediante centellograma óseo

Se presenta el caso de un varón de 62 años en seguimiento por cáncer de próstata metastásico a niveles ganglionar y óseo, con progresión en retroperitoneo. Se efectuó un centellograma óseo de control con ^{99m}Tc -HMDP, que evidenció captación patológica en T6, 7mo. arco costal izquierdo e íliaco derecho.

Como dato adicional, se observó acumulación progresiva del trazador extraóseo en proyección pararenal izquierda de distribución en cuña, impresionando como extravasación urinaria (Fig. 1). Adicionalmente, se realizaron adquisiciones tomográficas SPECT cuya distribución sostuvo la sospecha diagnóstica. Por esta razón, se examinó retrospectivamente un estudio tomográfico de días previos, que confirmó fuga de orina en coincidencia con extravasación de contraste endovenoso en espacios perirrenales (Fig. 2).

Fig. 1





Fig. 2



Martina Musumeci¹, Verónica Blanchet¹, Mariano López Suárez¹, Sebastián Collado¹,
Martín Ángel², María Silvana Racioppi¹

¹Servicio de Medicina Nuclear y PET/TC, ²Servicio de Oncología Clínica,
Instituto Alexander Fleming, Buenos Aires, Argentina
e-mail: martinamusumeci@hotmail.com